AVERTISSEMENTS

AGRICOLES DLP25-6-74260052

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE -

## ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

ABONNEMENT ANNUEL

PARIS. HAUTS DE SEINE, SEINE SI DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

30 FRS

RÉGISSEUR RECETTES-AYANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Rue Paul-Doumer, 93100 MONTREUIL s/BOIS - 287 76-71
C. C. P. PARIS 9063-96

BULLETIN Nº 12 - 13 JUIN 1974.

CULTURES FRUITIERES

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

En secteurs chauds, les sorties en cages et les captures en pièges qui s'étaient succédées irrégulièrement entre le 24/5 et le 5/6 sont devenues très faibles sinon nulles ensuite, pour reprendre le 11. Pendant cette période, les températures ont été favorables les 30/5 et surtout du 2 au 4/6, moyennes du 26 au 29/5 et le 1/6, défavorables le 31/5 et du 6 au 10/6. Par suite du fléchissement des températures, les éclosions larvaires notables se produiront vers le 15/6, surtout du 18 au 21/6, et elles ne reprendront ensuite qu'après le 25/6. En secteurs froids, quelques captures peu sérieuses ont été réalisées entre le 2 et le 5 juin avec températures favorables le 4 juin, mais surtout les 2 et 3, ce qui entraînera quelques éclosions larvaires entre le 20 et le 25 juin (compte tenu des températures actuelles).

CARPOCAPSE DES PRUNES : les éclosions devraient continuer jusqu'au 22 et reprendre après une interruption de quelques jours.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER : les dernières projections ont été faibles, confirmant ainsi que le stock d'ascospores arrive à épuisement (voir précédent bulletin).

PSYLLES DU POIRIER : les pontes récentes sont relativement rares. Les éclosions larvaires se poursuivent.

ACARIENS: situation variable suivant les vergers, ainsi dans un même secteur, pour des conditions de variétés et d'exposition identiques, les éclosions varient entre 20 et 75%. Les indications du bulletin nº 11 restent valables.

CULTURES LEGUMIERES

MOUCHE DU CHOU - TEIGNE DU POIREAU : le vol continue, des pontes de Teigne ont été observées vraisemblablement déposées les premiers jours de juin.

GRANDES CULTURES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE: les dernières pluies d'orage, 8 et 9 juin notamment, se sont succédé à intervalles assez rapprochés. Elles ont pu créer dans <u>les situations les plus favorables</u> (exposition, terrain, végétation ....) des conditions propices aux contaminations. Les taches pouvant en résulter devraient apparaître au début de la semaine prochaine. Un traitement généralisé à l'ensemble des cultures ne semble pas s'imposer.

COLZA DE PRINTEMPS : la végétation s'étale entre le début de dégagement de l'inflorescence et le début d'écartement des boutons. Nous rappelons que les seuils retenus sont, par inflorescence, de 1 méligèthe quand les boutons sont accolés, 2 à 3 lorsqu'ils sont écartés.

L'Ingénieur et le Technicien chargés des Avertissements Agricoles H. SIMON et R. MERLING L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription R. SARRAZIN

P341

Imprimerie de la Station Région Parisienne - Directeur - Gérant; L. BOUY